




День сброса зимней шкурки

Весенняя линька — обычное дело для зайцев, лис, медведей, белок и лосей. Животные избавляются от подпушка, согревавшего их в зимнюю стужу, и меняют цвет шерсти. С приходом тепла начинают линять и домашние питомцы — кошки и собаки, несмотря на то, что сотни тысяч лет они проживают вместе с людьми, а не обитают в условиях дикой природы. В честь физиологических особенностей животных, символа обновления и трансформации, учрежден забавный праздник. **8 апреля** отмечается **День сброса зимней шкурки**. Природа дарит человеку возможность понаблюдать за обновлением и перерождением живых организмов не только весной. Так, змеи в течение года не единожды сбрасывают кожу с деформированными чешуйками и повреждениями, полученными от паразитов или ран. В процессе роста линяют



и гусеницы. Они вынуждены сбрасывать старую кожу, которая не растягивается, меняя ее 4-5 раз в год, чтобы в результате превратиться в куколку. Однако массовая линька наблюдается у некоторых млекопитающих, беспозвоночных и птиц именно весной.

В это время года любители природы отправляются в зоопарк или лес, чтобы увидеть, как меняют свой окрас ласки, куницы, белки, зайцы и горностаи. В средней полосе России линька животных чаще всего наблюдается в марте и апреле. Говорить о сбросе шкурки весной не совсем корректно. У животных происходит замена шерсти и перьев, а кожный покров остается без изменений. Сбрасывание оперения присуще и пернатым. У полевой совы и белой куропатки это происходит два раза в год вместе со сменой окраса. Брачная линька присуща уткам, скворцам, луговому тетереву, дрофе.

Линька присуща и беспозвоночным животным. Так, раки-отшельники сбрасывают панцирь, когда он становится им мал. По окончании линьки животные поедают свой старый экзоскелет для восстановления баланса кальция в организме.