

LES IST EN BREF




Une IST se transmet lors de rapports sexuels anaux, vaginaux ou oro-génitaux.

Les IST fragilisent les muqueuses, elles augmentent le risque de contamination au VIH (virus du sida)



- Importance de se faire soigner pour éviter les complications
- S'accompagner de professionnels pour les soins et les traitements
- Suivre le traitement dans toute sa longueur, tout en utilisant des préservatifs lors de rapports
- Prévenir et informer son/ses partenaires afin de réaliser un dépistage



CONTACTS UTILES

- **Sida Info Service**
Informations et écoute, services gratuits et anonymes
0 800 840 800
sida-info-service.org
- **Question sexualité**
Informations et conseils sur la sexualité
questionsexualite.fr
- **Hépatite Info Service**
Informations et écoute, services gratuits et anonymes
0 800 845 800
hepatites-info-service.org
- **CeGIDD**
Centre Gratuit de Dépistage et de Diagnostic
- **Centre de santé sexuelle**

© Édition 2023 - rédigé par la FRAPS PS antenne 45 du Loiret



LES IST : LES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

SYPHILIS

Symptômes : apparition 2 à 4 semaines après la contamination. Chancre (petite plaie indolore), boutons ou plaques rouges sur la peau et muqueuses.

Diagnostic : examen médical et prise de sang.

Complications : atteinte du cerveau, des nerfs, du cœur, des artères et des yeux, atteinte du nouveau-né.

CHLAMYDIA

Symptômes : apparition 1 à 2 semaines après contamination. Brûlures, écoulements, fièvre, douleur au bas ventre, angine.

Diagnostic : prélèvement local au niveau du vagin, gorge et anus.

Complications : stérilité, grossesse extra-utérine.

Traitement : antibiotiques

PAPILLOMAVIRUS

Symptômes : apparition 1 à 8 semaines après contamination. Verrues (condylomes) sur les organes génitaux ou anus.

Diagnostic : examen médical ou frottis du col de l'utérus.

Complications : cancer du col de l'utérus et/ou de l'an.

Traitements : locaux des verrues (crème, chirurgie, laser etc.). Vaccin : de 11 à 14 ans, possibilité rattrapage jusqu'à 19 ans. Et hommes de moins de 27 ans ayant rapports avec d'autres hommes.

HEPATITE B

Symptômes : apparition 2 à 8 semaines après contamination. Fatigue, douleurs musculaires et articulaires, fièvre, maux de tête, nausées, diarrhées, urines foncées, teint jaune.

Diagnostic : prise de sang

Complications : cirrhose, cancer du foie, atteinte du nouveau-né.

Traitement : vaccin

HERPES

Symptômes : 1 semaine après. Petits boutons douloureux (cloques) sur les organes génitaux, l'an.

Diagnostic : examen médical

Complications : atteinte nouveau-né

Traitement : anti-douleurs sur ordonnance.

MYCOPLASMES TRICHOMONASE

Symptômes : apparition 1 semaine après la contamination.

Diagnostic : prélèvement local

Traitement : antibiotiques et traitement local (crèmes, ovules)

GONOCOCCIE

Symptômes : apparition 2 à 7 jours après contamination. Brûlures, écoulement jaune au niveau de la verge, du vagin ou de l'an.

Diagnostic : prélèvement local au niveau du vagin, gorge et anus ou analyse d'urine pour les hommes.

Complications : infections des articulations, douleurs abdominales chroniques, stérilité, grossesse extra-utérine.

Traitement : antibiotiques et traitement local type ovules et crèmes.

VIH / SIDA

Symptômes : apparition 2 semaines après la contamination. Fièvre, éruption cutanée, fatigue, diarrhée. Disparition des symptômes puis réapparition témoignant de l'affaiblissement immunitaire.

Diagnostic : prise de sang ou dépistage à l'aide d'un Test Rapide d'Orientation Diagnostique (TROD) ou autotest.

Complications : sida, atteinte du nouveau-né.

Traitement : aucun traitement guérissant mais traitement à vie bloquant l'évolution.